

## Bois de pintade

***Coptosperma borbonicum* (Hend. Et Andr.Hend.) De Block**

Rubiaceae



Le Bois de pintade appartient à la famille des Rubiaceae. L'espèce est endémique de La Réunion et de Maurice. Elle est appelée Bois de pintade à La Réunion, en raison de la coloration caractéristique de ses feuilles juvéniles. A La Réunion, elle est observée au niveau des zones semi-sèches à humides. Cet arbre peut faire entre 2 à 12 mètres de hauteur, il est rare en milieu naturel.

### Description

On observe au niveau du feuillage une hétérophylie bien marquée : les feuilles juvéniles sont longues avec des nervures rouges ou roses, vert foncé ; alors que les feuilles de l'arbre adulte sont plus petites, de forme ovale, et sont de couleur vert sombre uniforme au dessus et vert clair en dessous. Le stade juvénile est sensible à une exposition directe au soleil. Les petits fruits noirs à maturité, sont groupés en grappes.

Sources :

- [https://atlas.borbonica.re/static/medias/fiches\\_especies\\_life\\_fs/Life-FS\\_fiche\\_espece\\_706076.pdf](https://atlas.borbonica.re/static/medias/fiches_especies_life_fs/Life-FS_fiche_espece_706076.pdf)
- <https://mascarine.cbnm.org/index.php/flore/index-de-la-flore>

Fiche réalisée par Erika Oili, Camille Pothin & Jade Rivière-Turpin – Cap AEPE 2024-2025

Equipe pédagogique : Marc Attié, Didier Huitelec

© Crédit photo : Marc Attié