



**FOU AUSTRAL**  
*Morus serrator*





# FOU AUSTRAL

## *Morus serrator*



Ordre des Suliformes – Famille des Sulidés

### DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE :

Il se trouve le long des côtes au sud-est de l'Australie, de Tasmanie et de Nouvelle-Zélande. Il hiverne dans les eaux voisines des îles subantarctiques et peut remonter le long des côtes ouest et est de l'Australie. Depuis les années 1980, une poignée d'individus fréquente l'île Saint-Paul. La première donnée de reproduction remonte à 1987, et depuis 2 ou 3 couples se reproduisent régulièrement sur cette île.

### HABITAT :

Il est strictement pélagique et erre au-dessus de la plateforme continentale ou des eaux côtières. Il se reproduit dans des îles découvertes au large.

### ALIMENTATION :

Il se nourrit de pilchards, anchois et maquereaux, et de quelques autres petits poissons, ainsi que de calmars.

### COMPORTEMENT :

Comme les autres membres de la famille des *Sulidés*, il plonge d'une hauteur de plusieurs dizaines de mètres pour capturer ses proies sous l'eau. Il suit régulièrement les chalutiers pour récupérer les débris de pêche. Les parades sont semblables à celles des autres *Sulidés*. Ces oiseaux sont toujours très beaux et gracieux dans leurs mouvements, mais ils peuvent devenir agressifs envers leurs voisins dans les cas de défense du site du nid aux colonies. Il reste en général au voisinage de la colonie après la reproduction. En revanche, les jeunes se dispersent et peuvent parcourir jusqu'à plus de 2 500 km en une semaine.

### REPRODUCTION :

La saison de reproduction a lieu entre octobre et mai. Il est très saisonnier et niche sur le sol, en général en colonies denses mais petites. Le nid est fait avec des herbes et des algues formant un amas grossier. Les matériaux sont soudés entre eux avec les déjections. La femelle dépose un seul œuf, rarement deux. L'incubation par les deux parents dure 44 jours. Le poussin est nourri par les deux adultes. Il est emplumé 100 jours après la naissance.

- Taille : 84 - 91 cm
- Envergure : 165 - 180 cm
- Poids : 2,1 - 2,4 kg



© F. LÉBOUARD - TAAF



© F. LÉBOUARD - TAAF

### MENACES :

L'espèce est actuellement considérée comme "Préoccupation mineure" à l'échelle mondiale, en dépit des aires de reproduction réduites. Il a été persécuté (prélèvement des œufs) pendant la première moitié du XX<sup>ème</sup> siècle, mais aujourd'hui, les populations sont en train d'augmenter lentement.