



**FRÉGATE DU PACIFIQUE**  
*Fregata minor*





# FRÉGATE DU PACIFIQUE

## *Fregata minor*



Ordre des Suliformes – Famille des Frégatidés

### DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE :

Elle se rencontre principalement dans l’océan Pacifique et dans l’océan Indien bien qu’une population existe également dans l’Atlantique Sud.

### HABITAT :

Elle vit dans les océans tropicaux et subtropicaux et se reproduit sur les petites îles.

### ALIMENTATION :

Elle se nourrit principalement de poissons (poissons volants) et de calmars, mais elle consomme aussi les œufs et les poussins des autres oiseaux de mer, les jeunes tortues, les charognes et les restes de poissons.

### COMPORTEMENT :

Elle se nourrit tout en volant, en happant sa proie juste sous la surface de l’eau ou dans les airs. Elle ne peut pas s’y poser car elle est incapable de s’envoler depuis l’eau. Pendant la saison de reproduction, les mâles gonflent leur poche gulaire et pointent leur bec vers le ciel afin d’attirer une femelle. Ils font sursauter leurs ailes et leur tête d’excitation en faisant vibrer leur bec contre la poche gonflée pour produire une sorte de tambourinage. Elle passe la majeure partie de son temps dans les airs à planer sans effort et peut monter très haut dans le ciel, ayant un corps très bien adapté à sa vie aérienne. Elle peut planer pendant des heures, voire des jours entiers.

### REPRODUCTION :

Elle peut se reproduire n’importe quand dans l’année, mais généralement plutôt en saison sèche. Elle niche en colonies, dans des buissons ou des arbres. Les colonies peuvent comprendre de dix à plusieurs milliers de couples, parfois mélangés avec d’autres oiseaux de mer (frégate ariel et fou à pieds rouges). Le nid est construit par le couple ; la femelle y dépose un seul œuf blanc terne, et les deux adultes incubent pendant 55 jours. Le poussin quitte le nid au bout de 4 à 6 mois après l’éclosion, mais les adultes s’en occupent encore et le nourrissent pendant 5 à 14 mois supplémentaires. Les frégates ont ainsi la plus grande période de soins parentaux des oiseaux. Cette espèce produit une seule couvée tous les 2 ans, parfois uniquement tous les 3 ou 4 ans.

- Taille : 85 - 105 cm
- Envergure : 205 - 230 cm
- Poids : 1,1 - 1,7 kg



### MENACES :

L’espèce est actuellement considérée comme "Préoccupation mineure" à l’échelle mondiale. Elle peut craindre les dérangements sur son site de nidification. Elle peut être la proie des rats introduits sur les zones de reproduction. L’industrie de la pêche qui réduit ses sources de nourriture constitue également une menace importante.