



PAILLE-EN-QUEUE À BEC JAUNE
Phaethon lepturus



PAILLE-EN-QUEUE À BEC JAUNE

Phaethon lepturus

Ordre des Phaethontiformes – Famille des Phaéthontidés

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE :

Il se rencontre dans la partie tropicale de l'Atlantique, dans l'ouest du Pacifique et dans l'océan Indien.

HABITAT :

Il est pélagique, mais peut quand même fréquenter les côtes pour se nourrir. Cette espèce se reproduit sur de petites îles océaniques, sur des falaises, ou parfois dans une fourche d'arbre.

ALIMENTATION :

Il se nourrit de petits poissons, surtout des poissons volants souvent capturés en vol. Il consomme aussi des calmars et des crabes.

COMPORTEMENT :

Il capture ses proies en plongeant d'une hauteur de 20 mètres environ, comme les fous. Cependant, les poissons volants sont souvent capturés en vol. Les proies sont détectées en voltigeant au-dessus de l'eau ; il avale sa prise avant de s'envoler. Pendant la saison de reproduction, il effectue de beaux vols nuptiaux : les deux partenaires volent en parallèle et effectuent des acrobaties et des figures synchronisées en vol. Les serpentinaux de la queue de l'oiseau qui est au-dessus sont tournés vers le bas en direction de l'autre oiseau, et peuvent même le toucher. Ces vols sont en général accompagnés de cris stridents.

REPRODUCTION :

La saison de reproduction peut être continue tout le long de l'année. Il est monogame et les couples restent ensemble pendant plusieurs années. Il forme des colonies lâches, souvent sur des falaises, nichant dans les crevasses rocheuses, sous des corniches, ou sur le sol dans une dépression abritée, mais aussi dans la fourche d'un arbre. Il défend vigoureusement le site du nid en donnant des coups de bec à l'opposant ou aux oiseaux trop proches. Quand le nid est prêt, la femelle dépose un seul œuf, très variable en couleurs et marques. L'incubation dure environ de 40 à 42 jours, partagée par les deux parents. Le jeune quitte le nid au bout de 70 à 85 jours après la naissance et il effectue son premier vol très vite.

- Taille : 70 - 82 cm
- Envergure : 90 - 95 cm
- Poids : 220 - 410 g



© TAAF



© TAAF

MENACES :

L'espèce est actuellement considérée comme "Préoccupation mineure" à l'échelle mondiale. C'est l'espèce de phaétons la plus nombreuse, mais quelques populations ont décliné à cause de la perte de leur habitat. Les principaux prédateurs sont les rats introduits qui prennent les œufs et tuent les oiseaux. Les dérangements humains jouent aussi un rôle important dans certains déclinés.